

Faveiro

# Faveiro

**Classification botanique** *Pterodon pubescens* Benth.

**Famille** Légumineuses

**Noms vulgaires** Faveiro, Sucupira liza. ou *S. branca*.

**Distribution** On le rencontre surtout dans les « cerrados ». Actuellement, il commence à disparaître et on le trouve dans quelques régions du nord-ouest et du nord-est de l'État.

**Caractères distinctifs** Arbre de taille moyenne, mais qui peut atteindre de grandes dimensions, à écorce lisse. Feuilles composées de 20-36 folioles, arrondies ou obtuses au sommet, dessus d'abord pubescent, puis glabre. Inflorescence en panicules grandes, à fleurs petites, rouge-pâle. Fruit légume sub-ligneux, plein d'une huile à odeur forte.

**Floraison et fructification** Flor. Juillet-octobre.

**Bois** brun foncé ou jaune-brunâtre, très résistant, dur à la coupe.

**Densité** 0,890 à 1,020

**Usages et emplois** Cet arbre fournit du bois pour les constructions civiles et les constructions navales et des traverses de chemins de fer, de première qualité. On en tire des poteaux. Il résiste bien à l'humidité. On l'utilise pour les planchers des wagons de marchandises.


**Observations** Dans l'État de São Paulo il est caractéristique des terres sèches.

## Figueira branca

Classification botanique *Urostigma* sp.

Famille Urticacées

Noms vulgaires Figueira branca, Figueira brava, F. do matto




Figueira branca (gr. nat.)

Distribution Très commun dans tout l'État.




Figueira branca

**Caractères distinctifs** Arbre de grande taille, pouvant atteindre de dimensions gigantesques, surtout en diamètre. Arbre rameux, à couvert épais, à feuilles alternes, pétiolées, lisses, brillantes, ovales, grandes.



*Figueira preta* (gr. nat.)

Dans l'État de São Paulo on rencontre trois espèces de *Figueiras*, du genre *Urostigma* et qu'on



Figueira branca

désigné sous les noms vulgaires de Figueira branca, F. preta et F. amarella. Ce dernier arbre est commun surtout dans la Serra da Cantareira; on rencontre les deux autres espèces disséminées dans tout l'État.

**Bois** mou, léger et sans consistance. Il est blanc ou blanc-jaunâtre.

**Usages et emplois** On n'utilise le bois de cet arbre que pour la confection des gamelles et pour la construction des pirogues.

**Observations** Dans l'État de São Paulo il est caractéristique des terres de bonne qualité, parfaitement adaptées à la culture du caféier.


## Folha de bolo

Classification botanique *Platyscyamus regnelli* W.

Famille Légumineuses

Noms vulgaires Folha de bolo, Pereira, Páu pereira.

Distribution Commun dans l'État, surtout sur le plateau intérieur



Folha de bolo (1/2 gr. nat.)

**Caractères distinctifs** Arbre de taille moyenne, mais qui, parfois, atteint de grandes dimensions, à feuilles composées de 3 folioles grandes, cordiformes, acuminées, pouvant atteindre jusqu'à 30 centimètres de longueur et largeur. Inflorescence en panicules tomenteuses, à fleurs blanches et couleur violette. Fruit légume grand, contenant jusqu'à 5 graines, mais en général à 2-3 graines.

**Floraison et fructification** Flor. Février-avril. Fruct. Mai-août.

**Bois** jaunâtre ou rougeâtre

**Densité** 10.830

**Usages et emplois** Cet arbre fournit du bois pour les constructions civiles. On en tire des poteaux et des planches. Le bois est utilisé aussi dans la tonnelerie.


## Fruta de lobo

Classification botanique *Solanum grandiflorum* Mart.

Famille Solanacées

Noms vulgaires Fruta de lobo, Lobeira.

Distribution Très commun dans tout l'État



Fruta de lobo (1/2 gr. nat.)

**Caractères distinctifs** Arbuste ou petit arbre qui peut atteindre 4-5 mètres de hauteur, surtout dans la région limítrophe de l'État de Minas Geraes, près de Barretos. Feuilles solitaires, ovales, oblongues ou lancéolées, rarement entières, tomenteuses en dessous, glabres en dessus. Inflorescence en cymes terminales. Fruit baie globuleuse, grande, velue.

**Usages et emplois** Le bois donne du charbon qui est utilisé, tout particulièrement, pour la fabrication de la poudre.


## Fruta de macaco

**Classification botanique** *Posoqueria acutifolia* Mart.

**Famille** Rubiacées

**Noms vulgaires** Fruta de macaco, Páu de macaco.

**Distribution** On le rencontre surtout dans la Serra do Mar et dans la Serra da Cantareira.



Fruta de macaco (2/3 gr. nat.)

**Caractères distinctifs** Arbre de taille moyenne, à feuilles courtement pétiolées, oblongues ou ovales-oblongues, entières. Inflorescence en ombelles pauciflores, courtement pédonculées. Fruit grande baie jaune, à graines irrégulières, polyédriques ou trigones.

**Floraison et fructification** Flor. Décemb-avril. Fruct. Mars-mai.

**Bois** jaune clair, homogène.

**Densité** 0,700

**Usages et emplois** Le bois donne des petites pièces pour la menuiserie et pour la confection des manches d'outils. Il se travaille bien au tour. On s'en sert pour faire des cannes.

## Fruta de pomba

**Classification botanique** *Maytenus salicifolia* Reuss.

**Famille** Célastracées

**Nom vulgaire** Fruta de pomba

**Distribution** Très commun dans l'État.

**Caractères distinctifs** Petit arbre à rameaux longs et débiles. Feuilles entières, brillantes en dessus, vert-pâle en dessous. Inflorescences axillaires, nombreuses, à fleurs petites, blanchâtres.

**Floraison et fructification** Flor. Avril juillet.

**Usages et emplois** Le bois sert à la confection des caisses d'emballage et des sabots. Il se tourne bien.

**Observations** On appelle aussi «Fruta de pomba» un autre arbre de la famille des Anacardiées — *Tapirira guyanensis* Engl. — qui nous décrirons sous la désignation de «Páu pombo».

## Fruta de tucano

**Classification botanique** *Vochysia tucanorum* Mart.

**Famille** Vochysiacees

**Noms vulgaires** Fruta de tucano, Páu de tucano, Páu doce, Vinheiro do mattô, Coxa de frango, Caixeta.

**Distribution** Très commun dans tout l'État, surtout dans les «cerrados».

**Caractères distinctifs** Arbre de taille moyenne, à écorce subereuse très épaisse. Feuilles verticillées, ou alternes, oblongues ou lancéolées, vert-foncé, brillantes. Inflorescence en panicules cylindriques, terminales et axillaires, à fleurs jaunes. Fruit capsule.

**Floraison et fructification** Flor. Octob.-mars. Fruct. août-octob.

**Bois** blanc et léger.

**Densité** 0,930

**Usages et emplois** Cet arbre fournit du bois utilisé, presque exclusivement, en menuiserie. On en tire aussi des poteaux.


**Observations** On appelle aussi «Fruta de tucano» un arbuste de la famille des Erythroxyllacées — *Erythroxyllum microphyllum* St. Hil. — très commun dans les régions champêtres et dans les «cerrados».

# Fumo bravo

Classification botanique *Solanum leontopodium* Sendt.

Famille Solanacées

Noms vulgaires Fumo bravo, Govitinga, Guvitinga.



Fumo bravo (gr. nat.)

Distribution Commun dans tout l'État, surtout sur le plateau intérieur.

**Caractères distinctifs** Arbuste ou petit arbre, qui atteint parfois jusqu'à 6 mètres de hauteur et 15-18 centimètres de diamètre. Feuilles solitaires, ovales-lancéolées, acuminées au sommet et à la base, entières, tomenteuses sur les deux faces. Inflorescence en cymes terminales, courtement pédonculées. Fruit baie globuleuse, glabre, à graines nombreuses, grandes.

**Floraison et fructification** Il fleurit et fructifie presque toute l'année.

**Usages et emplois** Le bois donne du charbon utilisé pour la fabrication de la poudre.