



Quaresmeira

Classification botanique *Tibouchina mutabilis* Cogn.

Famille Mélastomacées

Noms vulgaires Quaresmeira, Flôr de maio, F. de quaresma, Cuipeúna, Páu de flôr.



Quaresmeira (gr. nat.)

Distribution Commun dans la Serra do Mar.

Caractères distinctifs Petit arbre de 4-7 mètres de hauteur pouvant atteindre jusqu'à 10-12 mètres. Feuilles courtement pétiolées, entières, oblongues-lancéolées, rigides, aiguës, vert foncé sur la face supérieure. Inflorescence, en général, solitaires au sommet des rameaux. Fruit capsule.

Floraison et fructification Flor. Janvier-mars. Fruct. Juin-juillet


Usages et emplois Cet arbre donne des poutrelles et du bois de chauffage.

Quina brava

Classification botanique *Miconia wildenowii* Klotz.

Famille Mélastomacées

Nom vulgaire Quina brava



Quina brava (2/3 gr. nat.)

Distribution On le rencontre surtout dans la Serra do Mar
et dans la Serra da Cantareira.

Caractères distinctifs Arbre de 20 à 25 mètres de hauteur avec un diamètre de 25 centimètres. Feuilles dressées, longues et étroites, vert pâle en dessus, gris en dessous. Inflorescence en panicules grandes. Fruit baie noire, sub-rugueuse, petite.

Floraison et fructification Flor. Juin-août et octobre-décembre.

Bois rougeâtre

Densité 0,750 à 0,867

Usages et emplois On n'utilise le bois que pour la confection des caisses d'emballage.